EXTRAIT DES ACTES DE LA SOCIÉTÉ LIBRE DES PHARMACIENS...

26

EXTRAIT DES ACTES

DE LA SOCIÉTÉ LIBRE

DES PHARMACIENS

DE LA VILLE D'ANVERS.

A ANVERS,

IMPRIMERIE DE J. JOUAN, PLACE-VERTE.

1840.

EXTRAIT DES ACTES

DE LA SOCIÉTÉ LIBRE

DES PHARMACIENS

DE LA VILLE D'ANVERS.

A ANVERS,

IMPRIMERIE DE J. JOUAN, PLACE-VERTE.

1840.

EXTRAIT DES ACTES DE LA SOCIÉTÉ LIBRE DES PHARMACIENS DE LA VILLE D'ANVERS.

La Société formée dans le but d'être utile et ne voulant rien négliger qui puisse contribuer à y parvenir, résolut en 1837 de faire imprimer et publier son premier recueil, contenant les formules de certains médicaments, dont le mode de préparation ne se trouvait pas consigné dans la Pharmacopée Belgique, se proposant en même temps de répéter ces publications annuellement s'il y avait lieu. Cependant, plusieurs circonstances l'ayant déterminée à retarder ces publications, et entre autres l'espoir de voir paraître avant la fin de la dernière session législative la nouvelle Pharmacopée, ainsi qu'une loi organique sur l'exercice de la médecine et de la pharmacie, deux objets dont la promulgation est vivement réclamée par tous les pharmaciens, comme étant d'une urgence et d'une utilité incontestables dans l'état actuel de l'art de guérir : la Société considérant que l'époque de la mise en vigueur de la nouvelle Pharmacopée pourrait être encore assez éloignée, et convaincue

de l'importance de mettre autant que possible de l'uniformité dans l'exécution de plusieurs préparations, pour lesquelles le codex obligatoire ne renferme pas de procédés, vient de décider de faire réimprimer son formulaire, et afin de le rendre plus complet, de l'augmenter de plusieurs formules de médicaments, tant anciens que nouveaux, pour la préparation desquels les procédés et les proportions étant indiqués de manières si variées dans les divers dispensaires, doivent nécessairement donner lieu à des produits ou des résultats différents, et rendre les effets douteux ou incertains. Les sociétaires se sont en outre engagés à suivre exclusivement les procédés indiqués par ce formulaire, jusqu'à ce que la nouvelle Pharmacopée ait paru et en aura disposé autrement

Persuadée de l'influence salutaire que doit exercer sur leurs vertus médicinales la préparation uniforme des médicaments, que même le salut des malades peut en dépendre, la société ose espérer, que son travail sera apprécié et approuvé par tous les praticiens, qui n'ayant à cœur que la guérison des patients confiés à leurs soins, y trouveront une garantie contre l'inconstance des effets de plusieurs agens thérapeutiques.

La Société a décidé, en même temps, que les préparations usitées qui ne se trouvent pas consignées dans la Pharmacopée Belgique, mais qui le seraient dans la Pharmacopée du département des deux Nèthes, seraient exécutées d'après les procédés indiqués dans ce dernier ouvrage.

Enfin, elle a cru devoir se conformer au système de nomenclature chimique et botanique, adopté pour la rédaction de la Pharmacopée Belgique, tout en y joignant pour la partie chimique les noms généralement adoptés par les chimistes modernes.

Liste des Membres de la Société libre des Pharmaciens d'Anvers.

MEMBRES RÉSIDANTS

ACAR F. F. L.
BEX L. J. H.
BOCQUOUT E.
CORREMANS H. A. J.
GOOR J.
KERCKHOFS P. F.
MERTENS J.
MICHIELS J.
MOLYN J. F.
OLISLAEGER G. J.
PLUYMS A. J.
PYPERS J. H. I.
RIGOUTS F. J.
SCHEWYCK J.
SIROUX H. F.
SMET D.
STAES J. P.
VAN DE POEL P. F.
VAN DER HEYDEN J. A.
VAN HOEBROECK J. L.
VAN PELT J. B.
VERBERT F. M.
VERBUEKEN N.
VERLINDEN J.

MEMBRES CORRESPONDANTS.

LEBON L. F. à Bruxelles.
SOMERS J. C. à Herenthals.
VAN ERCKHOVEN J. père, à Lierre.
VAN ERCKHOVEN L. FILS, à Lierre.
STOFFELS L. à Malines.
DE LOECKER J. à Diest.
CROES G. L. à Hoogstraeten.
VERMEULEN P. J. A. à Hoogstraeten.
JANSSENS J. B. à Malines.
AERTS P. F. à Malines.
VAN BAER H. à Bois-le-Duc.
VAN MELEKEBEKE G. J. J. à Malines.
VAN PRAET P. J. J. à Moll.
DE ROUVROY à Liége.
VANDEN CORPUT à Bruxelles.

FORMULES ADOPTÉES.

NOTA. Les plantes ou leurs feuilles seront prises à l'approche de leur floraison, on aura soin de n'employer que celles de l'année. La densité de l'alcool a été constatée à l'aréomètre des Pays-Bas

PEROXIDE DE FER HYDRATÉ.

(Hydrate ferrique.)

R. Sulfate de fer pur (*Sulfate Ferreux*). . . .	10 onces.
Acide sulfurique.	2 onces.
Eau distillée	40 onces.
Acide nitrique.	q. s.

Faites dissoudre le sel de fer dans la quantité donnée d'eau distillée, ajoutez l'acide sulfurique et faites bouillir la dissolution dans une capsule de porcelaine, versez y ensuite une petite quantité d'acide nitrique, lorsque les vapeurs rouges produites par cette addition auront cessé de se dégager, ajoutez y une nouvelle quantité d'acide et répétez ces affusions jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de gaz, lorsque la liqueur sera refroidie, étendez la de 30 à 40 livres d'eau distillée et versez y un léger excès d'ammoniaque liquide (à peu près 16 onces), lavez le précipité jusqu'à ce que les eaux de lavage ne précipitent plus par une solution d'un sel de baryte et conservez l'oxide à l'état humide sous une couche d'eau distillée.

L'hydrate de peroxide de fer étant reconnu comme le meilleur contrepoison de l'acide arsénieux, la société considérant la haute importance de cet antidote et la nécessité de sa prompte administration après l'ingestion du poison, s'est occupée du mode de sa préparation et de sa conservation afin que ce précieux spécifique se trouvât tout prêt chez tous les pharmaciens et, pour ainsi dire, à tout moment sous la main, tout en exprimant des vœux pour la stérilité de son débit.

MURIATE D'OR.

(Chlorure aurique.)

R. Or pur et laminé.	1	gros.
Acide muriatique (*Acide Chlorhydrique*). .	2	gros.
Acide nitrique.	1	gros.

On mélange les deux acides dans un matras, on y introduit l'or convenablement divisé et on pose le matras sur un bain de sable, que l'on chauffe doucement jusqu'à ce que le métal soit dissout, on verse le liquide dans une capsule de porcelaine et on fait évaporer la dissolution jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'il commence à s'en dégager du chlore, on fait cristalliser et on enferme le produit dans un flacon bouché avec soin.

IODURE DE SOUFRE.

R Iode	1	once.
Soufre dépuré (*Soufre sublimé*) . . .	2	gros.

Faites un mélange intime des deux substances et introduisez le dans un matras ou fiole à médecine, faites chauffer par degrés jusqu'à ce que la masse soit fondue, faites refroidir, cassez le vase et introduisez le produit dans un flacon bouché à l'émeril.

HYDRIODATE DE POTASSE.

(Iodure Potassique.)

R Iode	2	onces
Limaille de fer	5	gros.
Eau distillée	1	livre.

Google

Mettez ces substances dans une capsule de porcelaine, faites chauffer en remuant le mélange jusqu'à ce que la liqueur soit décolorée, filtrez et versez y une solution de sous carbonate de potasse (environ 10 gros de sous carbonate sec) jusqu'à ce que le sel de fer soit entièrement décomposé, en ayant soin cependant de ne pas ajouter un excès d'alcali. Filtrez et lavez le résidu avec de l'eau distillée, réunissez les deux liqueurs, évaporez les à siccité et faites redissoudre le sel dans 10 onces d'eau distillée, faites évaporer jusqu'à pellicule et laissez refroidir lentement pour obtenir des cristaux.

IODURE DE FER.

(Iodure ferreux)

R. Iode . . . . . 2 onces.
Limaille de fer. . . . . 1/2 once.
Eau distillée . . . . . 3 onces.

Mettez l'eau et le fer dans une capsule de porcelaine, ajoutez y l'iode et chauffez jusqu'à ce que le liquide ait acquis la teinte verdâtre propre aux proto sels de fer, filtrez et évaporez rapidement jusqu'à siccité, renfermez le produit dans un flacon à l'émeril.

IODURE DE PLOMB.

(Iodure plombique)

R. Acétate de plomb cristallisé (*Acétate plombique*)
Hydriodate de potasse (*Iodure potassique*)
de chaque . . . . . 1 once.
Eau distillée . . . . . 8 onces.

On dissout séparement les deux sels dans la quantité donnée d'eau distillée, on filtre les deux solutions, on ajoute un peu d'acide acétique à la solution de l'acétate, de manière à ce qu'elle n'agisse que très faiblement sur la couleur du tournesol; on mêle ensuite les deux solutions jusqu'à ce qu'il ne s'y fasse plus de précipité, on ajoute alors un peu d'acétate de plomb tenu en réserve, on laisse reposer, on lave à froid avec de l'eau distillée, on fait sécher à l'ombre et on conserve dans un flacon bouché à l'abri de la lumière.

PROTO-IODURE DE MERCURE.

(Iodure mercureux)

R. Nitrate de protoxide de mercure (*Nitrate mercureux*) cristallisé . . . . . 2 onces.
Hydriodate de potasse (*Iodure potassique*) . . 1 once.

Après avoir dissous l'hydriodate dans 6 onces d'eau distillée et l'avoir filtré, ajoutez y peu à peu le protonitrate également dissout dans 8 onces d'eau distillée, jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de dépôt, lavez le précipité exactement à l'eau distillée, étant séché, on le conserve dans un flacon fermé et à l'abri de la lumière.

DEUTO-IODURE DE MERCURE.

(Iodure mercurique)

R. Hydriodate de potasse (*Iodure potassique*). . 16 gros
Muriate de deutoxide de mercure (*Chlorure mercurique*) . . . . . 15 gros.

On dissout séparément les deux sels dans une assez grande quantité d'eau distillée; on verse ensuite la solution du chlorure dans celle de l'hydriodate jusqu'à cessation de précipitation. (il faut éviter d'en ajouter un excès qui redissoudrait l'iodure) on lave exactement l'iodure précipité, on le fait sécher à l'ombre et on le conserve dans un flacon bouché et à l'abri de la lumière.

CYANURE DE POTASSIUM.

(Cyanure Potassique)

R. Prussiate de potasse et de fer (*Cyanure ferroso potassique*). . . . . q. v.

Concassez le sel et introduisez le dans un creuset muni de son couvercle, lutez les jointures en ayant soin de laisser une petite ouverture pour le dégagement des gaz et des vapeurs aqueuses, placez le creuset dans un fourneau et entourez le de quelques charbons ardents, élevez lentement et graduellement la température jusqu'au rouge ardent, entretenez la pendant un quart d'heure au moins à ce degré, bouchez lu-

verture du creuset avec un peu de lut et laissez refroidir, retirez la couche blanche séparez le soigneusement du résidu charbonneux et enfermez la promptement dans un flacon bouché avec soin.

La masse noire charbonneuse peut être utilisée pour la préparation du cyanure de zinc.

CYANURE DE ZINC.

(Cyanure Zincique.)

R. Sulfate de zinc pur (*Sulfate zincique*). . . . 1 once
Cyanure de potassium (*Cyanure potassique*). . q. s.

Après avoir dissous chacune de ces substances séparément dans une quantité suffisante d'eau distillée, versez peu à peu la solution de cyanure de potassium dans celle de sulfate de zinc jusqu'à ce qu'il ne se forme plus de précipité, lavez celui-ci par décantation avec de l'eau distillée chaude, jetez le sur un filtre, laissez égoutter et faites sécher à l'étuve.

On peut se servir avec avantage pour précipiter le sel de zinc d'une solution récemment préparée et filtrée du résidu noir charbonneux, obtenu lors de la préparation du Cyanure de potassium.

MORPHINE.

R. Opium brut (*Papaver somniferum*) . . . . 1 livre

Coupez l'opium en tranches minces faites le macérer dans l'eau et malaxez le résidu, répétez ce traitement trois ou quatre fois pour épuiser l'opium de toutes ses parties solubles, filtrez les liqueurs et réduisez les par l'évaporation à 10 livres, ajoutez y un excès d'ammoniaque liquide et faites bouillir pendant quelques instans en ayant soin de maintenir la liqueur légèrement alcaline, laissez refroidir et séparez le dépot qui s'est formé, faites le sécher, réduisez le en poudre, faites macérer celle-ci dans de l'alcool à 15 degrés, après un jour de contact séparez le liquide et ajoutez à la morphine une petite quantité decharbon animal, faites bouillir le mélange à plusieurs reprises dans de l'alcool à 25 degrés, filtrez chaque fois le liquide

bouillant, séparez la morphine qui se dépose par refroidissement et traitez le par l'éther sulfurique bouillant pour séparer la narcotine qu'elle pourrait retenir

STRYCHNINE.

R. Noix vomique (*Strychnos nux vomica*) . . 4 livres.

Repez la noix vomique faites la macérer dans l'eau, portez celle-ci à l'ébullition, répétez cette opération trois ou quatre fois, passez à travers une toile serrée et exprimez le marc à la presse. Réunissez les diverses décoctions, concentrez les par l'évaporation et ajoutez-y 6 onces de chaux vive (*Oxide calcique*) delayée dans l'eau, faites égoutter le précipité, exprimez le et faites dessécher à l'étuve, réduisez en poudre et faites bouillir avec suffisante quantité d'alcool à 25 degrés, répétez plusieurs fois ce traitement, réunissez les liqueurs filtrez et distillez les pour retirer la majeure partie de l'alcool, laissez refroidir, séparez la strychnine qui se dépose par refroidissement, traitez la par l'alcool à 10° pour séparer la majeure partie de la brucine et de la matière colorante, reprenez la strychnine par l'alcool à 25° et faites cristalliser, renouvellez deux ou trois fois ces cristallisations, en ayant soin de laisser chaque fois une petite quantité d'eaux mères, afin de séparer la brucine qui y est contenue.

VÉRATRINE.

R. Semences de Cévadille (*Veratrum Sabadilla*). q. v.

Préparez un extrait de Cévadille au moyen de l'alcool à 25 degrés, faites le dissoudre dans l'eau froide, filtrez la liqueur et ajoutez y du sous acétate de plomb liquide (*Sous acétate plombique*) séparez l'excès de plomb par un courant d'acide hydrosulfurique (*Acide sulfhydrique*) filtrez, évaporez la liqueur et précipitez la au moyen de l'ammoniaque liquide, desséchez le précipité traitez le par l'alcool à 25° filtrez et évaporez la teinture alcoolique à siccité. Faites dissoudre le vératrine impure dans l'éther sulfurique, filtrez et évaporez la teinture éthérée, séparez le produit délayez

le dans l'eau distillée, saturez au moyen de l'acide sulfurique, ajoutez y une certaine quantité de charbon animal lavé à l'acide muriatique (*Acide Chlorhydrique*) filtrez et précipitez la vératrine par l'ammoniaque, recueillez sur un filtre et faites sécher.

ACIDE TANNIQUE.

(Tannin.)

R. Noix de galles (*Quercus infectoria*). . . . . q. v.

Réduisez la noix de galles en poudre, placez la dans un appareil à déplacement en verre muni d'un bouchon, tassez légèrement la poudre et épuisez la au moyen de l'éther sulfurique pur additionné d'un dixième de son poids d'eau distillée; le liquide qui s'écoule se séparera en deux couches, séparez la couche la plus dense, versez la dans une capsule en porcelaine et faites évaporer à siccité à une très douce chaleur.

CITRATE DE FER.

(Citrate ferrique)

R. Acide citrique cristallisé . . . . . 2 onces
Peroxide de fer hydraté (*Hydrate ferrique*). . . q. s.

Faites dissoudre l'acide citrique dans 1 livre d'eau distillée, faites bouillir la solution dans une capsule de porcelaine et ajoutez y un léger excès d'oxide, laissez refroidir la liqueur filtrez et évaporez à siccité à une douce chaleur.

NITRATE DE PROTOXIDE DE MERCURE.

(Nitrate mercureux.)

R. Mercure pur. . . . . 6 1/2 onces.
Acide nitrique à 25° . . . . . 6 onces.

Faites dissoudre le mercure à une douce chaleur jusqu'à ce qu'il ne paraisse plus de vapeurs nitreuses; ajoutez à la dissolution 3 1/2 onces d'eau distillée chaude et après une légère ébullition, décantez la liqueur et faites cristalliser.

ACÉTATE DE MORPHINE.

℞. Morphine . . . . . 1 once.

Pulvérisez la morphine, délayez la dans l'eau, chauffez légèrement le mélange et ajoutez y de l'acide acétique, jusqu'à ce que la morphine soit dissoute, faites évaporer la liqueur à siccité, réduisez l'acétate de morphine en poudre et renfermez le dans un flacon bien bouché

MURIATE DE MORPHINE.

(Chlorhydrate de morphine)

℞ Morphine . . . . . q v

Délayez la morphine dans de l'eau distillée chande ajoutez y de l'acide muriatique (*acide chlorhydrique*) jusqu'à dissolution de l'alcaloïde, évaporez la solution, faites cristalliser et dessécher les cristaux obtenus en les plaçant sur plusieurs doubles de pspier joseph.

SULFATE DE MORPHINE.

℞ Morphine . . . . . q. v.

Réduisez la morphine en poudre, ajoutez y suffisante quantité d'eau chaude, saturez au moyen de l'acide sulfurique dilué, évaporez la liqueur, faites cristalliser et dessécher les cristaux à une douce chaleur

PRUSSIATE DE QUININE.

(Hydro cyano ferrate de quinine.)

℞ Sulfate de quinine . . . . 1 once

Alcool à 28°. . . . . 10 onces

Le sel de quinine étant dissout dans l'alcool à l'aide de la chaleur, on y ajoute 3 gros de prussiate de potasse et de fer (*Cyanure ferroso-potassique*) en poudre fine, on maintient le mélange pendant 3 a 4 heures à une température de 30° R en ayant soin de l'agiter souvent, on laisse refroidir, on filtre

et on évapore la liqueur à une légère chaleur jusqu'à siccité dans une capsule de porcelaine.

Nota : si l'on opérait sur des quantités plus considérables, on pourrait retirer l'alcool par la distillation au bain marie et le conserver pour servir dans les préparations ultérieures du même sel.

ESPÈCES AROMATIQUES.

R. Feuilles d'origan commun (*Origanum vulgare*).
» de sauge (*Salvia officinalis*)
» » menthe crépue (*Mentha crispa*)
» d'absinthe (*Artemisia absinthium*)
Fleurs de camomille romaine (*Anthemis nobilis*)
de chaque . . . . . 1 once
Incisez et mêlez.

ESPÈCES PECTORALES.

R. Feuilles de mauve (*Malva rotundifolia*)
» » guimauve (*Althæa officinalis*) de chaque 1 once
Fleurs de mauve
» » guimauve
» » bouillon blanc (*Verbascum thapsus*)
de chaque . . . . . 1/2 once.
Mêlez et conservez pour l'usage.

INFUSÉ ANTIHÉMORRHOÏDAL.

R Feuilles de séné (*Cassia senna*) . . . . . 1 once.
Racines de rhubarbe (*Rheum palmatum*) . . 1 gros
Eau bouillante . . . . . 8 onces.
Faites infuser pendant un quart d'heure, ajoutez à la colature.
Sirop de rhubarbe . . . . . 1 once
Mêlez.

INFUSÉ AROMATIQUE.

R Espèces aromatiques. . . . . 1 once.
Eau bouillante. . . . . 8 onces
Faites infuser à vase clos pendant un quart d'heure, passez.

INFUSÉ DE QUASSIA.

R. Bois de quassia (*Quassia amara*) en poudre grossière . . . . . 1 once.
Eau bouillante . . . . . q. s.
Faites infuser pendant une heure dans un vase couvert, passez, pour huit onces de colature.

INFUSÉ DE VALÉRIANE.

R. Racine de Valériane (*Valeriana officinalis*) grossièrement pulverisée . . . . . 1|2 onces.
Eau bouillante . . . . . 6 onces.
Faites infuser à vase clos pendant une demi heure, passez.

DÉCOCTÉ D'AMIDON.

R. Amidon en poudre . . . . . 2 gros.
Eau . . . . . 7 onces.
Versez l'eau peu à peu sur l'amidon en triturant; faites ensuite cuire légèrement jusqu'à ce que la liqueur soit réduite à six onces.

DÉCOCTÉ DE CARRAGAHEEN.

R. Lichen carragaheen (*Fucus crispus*) incisé. 1|2 once.
Eau . . . . . 3 livres.
Faites bouillir jusqu'à réduction de deux livres, passez.

DÉCOCTÉ DE LICHEN D'ISLANDE.

R. Lichen d'Islande (*Cetraria islandica*) . . . 1 once.
Eau. . . . . q. s.
Faites bouillir pendant une demi heure; passez avec expression, pour obtenir une livre de produit.

DÉCOCTÉ DE RACINES DE GUIMAUVE.

R Racines de guimauve (*Althæa officinalis*) coupées 1 1|2 once
Eau. . . . . q. s
Faites bouillir pendant un quart d'heure, passez, pour une livre de décocté

DÉCOCTÉ DE SALEP.

℞ Racines de salep (*Orchis mascula*) en poudre grossière. . . . . 1 1|2 gros.
Eau. . . . . 1 livre.

Faites bouillir pendant quelques minutes, passez avec expression.

DECOCTÉ DES DDIS.

(Décocté de Gayac composé)

℞ Bois de Gayac (*Guajacum officinale*) rapé. 1 1|2 once.
Racine de Bardane (*Arctium lappa*)
» de Squine (*Smilax China*)
» de Salsepareille (*Smilax syphilitica*
de chaque . . . . . 1|2 once.

Faites bouillir pendant une heure dans une quantité d'eau suffisante pour obtenir quatre livres, ajoutez vers la fin
Racine de Sassafras (*Laurus Sassafras*) rapée
» de reglisse (*Glycyrrhiza glabra*) coupée de
chaque . . . . . 2 gros.
Semences d'anis (*Sison anisum*) contusées . . . 1 gros.

Faites infuser en vase clos pendant une demi heure ; passez.

MUCILAGE DE CARRAGAHEEN.

℞ Lichen Carragaheen (*Fucus crispus*) incisé. 1 once.
Eau . . . . . 3 livres.

Faites bouillir jusqu'à réduction de 2 livres ; passez avec expression.

MUCILAGE LÉGER DE GOMME ARABIQUE.

℞ Gomme arabique (*Acacia vera*) en poudre . 1 once.
Eau distillée . . . . . 4 onces.

MUCILAGE LÉGER DE SEMENCES DE COINGS.

℞ Semences de coings (*Cydonia vulgaris*) contusées. 1 gros
Eau distillée . . . . . 6 onces.

Triturez dans un mortier non métallique et passez avec expression.

EXTRAIT DE LAITUE.

(Thridace).

R. Tiges de Laitue (*Lactuca sativa*) prises à l'époque de la floraison . . . . . q. s.

Pilez dans un mortier de marbre, exprimez le suc passez celui-ci à travers une toile et faites le évaporer dans des assiettes en couches peu épaisses, placées dans une étuve entretenue à une température inférieure à 40 degrés Réaumur jusqu'à ce qu'il ait acquis la consistance d'extrait.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE POIVRE CUBÈBE.

R. Poivre cubèbe (*Piper cubeba*) . . . . . 1 livre.
Alcool à 20 degrés . . . . . 4 livres

Faites macérer pendant quelques jours, passez avec expression, filtrez les liqueurs réunies distillez les au bain marie pour en retirer l'alcool et évaporez en consistance d'extrait.

EXTRAIT ÉTHÉRÉ DE FOUGÈRE MALE.

(Huile éthérée de Fougère mâle.)

R. Racines de fougère mâle (*Aspidium Filix mas*) récemment séchées . . . . . 1 livre.

Après avoir réduit les racines en poudre demi fine mettez la dans un appareil à déplacement et versez y une quantité suffisante d'éther sulfurique pour qu'elle en soit complètement imbibée; après 12 heures de macération ajoutez y encore 8 onces d'éther; lorsque l'écoulement aura cessé, déplacez la teinture éthérée restée dans le marc au moyen de l'eau, retirez le récipient aussitôt que l'eau commence à s'écouler; distillez la teinture éthérée pour en retirer la majeure partie de l'éther employé et achevez l'évaporation à une douce chaleur jusqu'en consistance d'extrait mou.

SIROP D'ANIS

℞ Huile volatile d'anis (*Sison anisum*). . . 4 gouttes.
Sucre blanc . . . . . 7 1/2 onces.
Eau distillée. . . . . 4 onces.

Triturez l'huile d'amis avec le sucre ajoutez l'eau distillée et faites un sirop par solution à froid.

SIROP D'ASPERGES

R. Turions d'asperges (*Asparagus officinalis*) . . q. v.
Pilez dans un mortier de marbre, exprimez le suc au moyen de la presse; clarifiez par coagulation au bain marie et passez à la chausse. Ensuite.
R. Suc ci-dessus. . . . . 16 onces
Sucre blanc. . . . . 30 onces
Opérez en la solution dans un bain marie fermé.

SIROP D'ABSINTHE.

R. Sommités d'absinthe (*Artemisia absinthium* 3 onces.
Eau bouillante. . . . . 2 livres,
Faites infuser en vases clos pendant douze heures, passez avec expression, filtrez la liqueur, et faites y dissoudre à la chaleur du bain marie le double de son poids de sucre blanc

SIROP DE BELLADONE.

R. Feuilles de belladone (*Atropa Belladona*)
récemment séchées et en poudre grossière . 1 once
Eau froide . . . . . q. s.
Versez l'eau sur les feuilles et chauffez la jusqu'au point d'ébullition; passez et répétez le même traitement pour obtenir en tout une colature de 18 onces, filtrez et faites dissoudre dans la liqueur 36 onces de sucre blanc.
Chaque once de sirop représente deux grains d'extrait

SIROP DE GOMME ARABIQUE

R. Gomme arabique blanche (*Acacia vera*) mondée et concassée. . . . . 4 onces
Eau froide . . . . . 6 onces.

Faites dissoudre la gomme dans l'eau, passez la liqueur à travers un blanchet sans l'exprimer, ajoutez y.

Sirop de sucre . . . . . 32 onces

Et faites cuire en consistance convenable.

SIROP DE CITRATE DE FER.

℞ Citrate de fer sec (*Citrate ferrique*) . . 1/2 once

Sirop de sucre. . . . . 15 onces.

Faites dissoudre le citrate dans une petite quantité d'eau distillée et ajoutez la dissolution au sirop bouillant.

Chaque once de sirop contient 16 grains de citrate de fer.

SIROP DE PIVOINE.

℞ Racines de pivoine (*Pæonia officinalis*) . . 2 onces

Eau bouillante . . . . . 10 onces

Sirop de sucre . . . . . 2 livres.

Versez l'eau bouillante sur les racines convenablement divisées faites infuser pendant 12 heures, passez avec expression, filtrez la liqueur, ajoutez la au sirop de sucre et faites cuire en consistance de sirop.

SIROP DE MANNE.

℞. Feuilles de Séné (*Cassia senna*). . . . . 1 once.

Faites infuser dans suffisante quantité d'eau pour obtenir huit onces de produit; ajoutez y

Sucre blanc . . . . . 8 onces.

Manne choisie. . . . . 4 onces.

Faites cuire en consistance de sirop.

SIROP DE SULFATE DE MORPHINE.

℞. Sirop de sucre . . . . . 1 once

ajoutez-y selon l'art. Sulfate de morphine 1/4 de grain.

SIROP D'ACÉTATE DE MORPHINE.

℞. Acétate de morphine. . . . . 1 grain.

Faites dissoudre dans une très petite quantité d'eau distillée acidulée au moyen de l'acide acétique, ajoutez à cette dissolution

Sirop de sucre . . . . . 4 onces

mêlez exactement

SIROP DE THRIDACE.

R. Sirop de sucre . . . . . 1 once.
Ajoutez y selon l'art. Thridace . . . . 6 grains.

GELÉE DE CARRAGAHEEN.

R. Lichen carragaheen (*Fucus crispus*) incisé . 2 gros.

Faites bouillir jusqu'à réduction de 6 onces passez avec expression et ajoutez

Sucre blanc . . . . . 3 onces.

Faites bouillir à un feu modéré, en enlevant l'écume qui pourrait se former, pendant le temps nécessaire pour réduire le mélange à 6 onces; coulez dans un pot et laissez refroidir.

VINAIGRE DE COLCHIQUE.

R. Bulbes récentes de Colchique (*Colchicum autumnale*). . . . . 2 onces.
Vinaigre de vin . . . . . 12 onces.
Alcool à 25° . . . . . 1 once,

Faites macérer pendant quinze jours, passez avec expression et filtrez.

VIN DE BULBES DE COLCHIQUE.

R. Bulbes fraiches de Colchique (*Colchicum autumnale*) . . . . . 3 onces.
Vin de Malaga . . . . . 16 onces.
Alcool à 25°. . . . . 1 once.

Faites macérer pendant quinze jours, exprimez et filtrez

TEINTURE DE BAIES DE GÉNÉVRIER.

R. Fruits de génévrier (*Juniperus communis*) concassés . . . . . 1 once.

Alcool à 12° . . . . . 8 onces.

Faites macérer pendant huit jours passez avec expression et filtrez

TEINTURE DE BELLADONE.

R. Feuilles de belladone (*Atropa belladona*) en poudre grossière . . . . . 1 once.

Alcool à 12° . . . . . 8 onces.

Faites digérer la poudre pendant huit jours dans la moitié de l'alcool; passez avec expression; délayez le marc avec le reste du véhicule; exprimez, mêlez les deux liqueurs et filtrez.

TEINTURE DE BRYONE BLANCHE.

R. Racine de bryone (*Bryonia alba*) en poudre grossière . . . . . 1 once.

Alcool à 12° . . . . . 8 onces

Faites digérer pendant huit jours, exprimez et filtrez.

TEINTURE DE BULBES DE COLCHIQUE.

R. Bulbes fraîches de colchique (*Colchicum autumnale*) . . . . . 3 onces.

Alcool à 25° . . . . . 4 onces.

Faites macérer pendant quinze jours, passez avec expression et filtrez.

TEINTURE D'IODE.

R. Iode pur. . . . . 1 gros

Alcool à 25°. . . . . 1 1/2 once.

Faites dissoudre dans un flacon à l'émeril.

TEINTURE DE JUSQUIAME.

R Feuilles de jusquiame (*Hyoscyamus niger*) en poudre grossière . . . . . 1 once.

Alcool à 12° . . . . . 8 onces.

Faites digérer les feuilles pendant huit jours dans 4 onces

d'alcool, passez avec expression, versez sur le marc les 4 onces d'alcool restantes et après une nouvelle digestion, exprimez et filtrez après avoir mêlé les deux teintures.

TEINTURE DE LOBELIA INFLATA.

R. Herbe contusée du lobelia inflata . . . . . 1 once
Alcool à 10° . . . . . 8 onces.
On opère comme pour la jusquiame.

TEINTURE DE RATANHIA.

R. Racine de ratanhia (*Kramería triandra*) concassée. . . . . 2 onces.
Alcool à 15°. . . . . 16 onces.
Faites digérer pendant quinze jours, passez et filtrez.

TEINTURE DE SABINE.

R. Feuilles de sabine (*Juniperus sabina*) en poudre grossière . . . . . 1 once.
Alcool à 12° . . . . . 8 onces.
Faites macérer pendant huit jours, exprimez et filtrez.

TEINTURE DE SEMENCES DE COLCHIQUE.

R. Semences de colchique (*Colchicum autumnale*) 1 once.
Alcool à 12° . . . . . 8 onces.
Les semences bien contusées sont mises en digestion avec la moitié de l'alcool pendant huit jours, on exprime ; on fait une nouvelle digestion avec le reste de l'alcool, on exprime de nouveau on mêle les deux liqueurs et on filtre.

TEINTURE DE STRAMONIUM.

R Feuilles de stramonium (*Datura stramonium*) 1 once
Alcool à 12° . . . . . 8 onces.
Réduisez les feuilles en poudre grossière et faites les digérer pendant huit jours dans la moitié de l'alcool prescrit passez avec expression, versez sur le marc le reste de l'al-

cool, faites digérer de nouveau, exprimez; mêlez les deux produits et filtrez.

BAUME DE VIE D'HOFFMANN.

R. Ambre gris en poudre (*Physeter macrocephalus*)
Huile volatile de rue (*Ruta graveolens*)
» » » Succin de chaque . . 1;2 scrupule
» » » Lavande (*Lavendula spica*)
» » » Marjolaine (*Origanum majorana*)
» » » Girofles (*Eugenia caryophyllata*)
» » » Macis (*Myristica moschata*)
» » » Canelle (*Laurus cinnamomum*)
Baume du Pérou (*Myroxylon peruiferum*)
de chaque . . . . . 1 scrupule.
Alcool à 25° . . . . . 10 onces.
Faites macérer pendant huit jours et filtrez.

TEINTURE D'OPIUM CAMPHRÉE.

(Elixir parégorique de Londres)

R. Camphre (*Laurus camphora*). . . . 2 1;2 scrupules.
Opium brut en poudre (*Papaver somniferum*)
Acide benzoique, de chaque. . . . . 72 grains
Huile d'anis (*Sison anisum*) 50 grains
Alcool à 14° . . . . . 36 onces
Faites macérer pendant quinze jours; filtrez.

ALCOOLAT D'ANHALT.

(Eau d'Anhalt)

R. Térébenthine de Venise (*Pinus larix*) 8 onces
Encens (*Boswellia serrata*) . . . . 1 1;2 once.
Girofles (*Eugenia caryophyllata*).
Noix muscades (*Myristica moschata*)
Cubèbes (*Piper cubeba*).
Canelle (*Laurus cinnamomum*) de chaque. 6 gros.
Baies de Laurier (*Laurus nobilis*).

Semences de fenouil (*Menm fœniculum*)
de chaque . . . . . 1|2 once
Safran (*Crocus sativus*) . . . . . 2 1|2 gros.
Musc (*Moschus moschiferus*) . . . . . 15 grains.

Réduisez toutes ces substances en poudre grossière, faites les macérer pendant quelques jours dans

Alcool à 18° . . . . . 5 livres

Distillez au bain marie de manière à retirer la plus grande partie de l'alcool.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE DIGITALE.

R Feuilles de digitale pourprée (*Digitalis purpurea*)
en poudre grossière . . . . . 1 once
Éther sulfurique . . . . . 6 onces.

Faites macérer dans un flacon à l'émérit, pendant huit jours, passez avec expression et filtrez.

TEINTURE ÉTHÉRÉE D'IODE.

R Iode pur . . . . . 1 gros.
Éther sulfurique . . . . . 1 1|2 once.

Faites dissoudre dans un flacon à l'émérit.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE LOBELIA INFLATA.

R. Herbe contusée de Lobélia inflata . . . . . 1 once.
Éther sulfurique alcoolisé . . . . . 8 onces.

Laissez le mélange en macération pendant huit jours dans un flacon à l'émérit et filtrez.

TEINTURE ÉTHÉRÉE DE VALÉRIANE.

R. Racines de Valériane (*Valeriana officinalis*), 1 once
Éther sulfurique . . . . . 6 onces.

Après avoir réduit les racines en poudre grossière faites la macérer pendant huit jours dans l'éther passez avec expression et filtrez

TABLETTES DE CARBONATE DE SOUDE.

(Pastilles de Vichy ou de d'Arcet.)

℞ Carbonate de soude (*Bicarbonate sodique*) pulvérisé . . . . . 1/2 once
Sucre blanc pulvérisé . . . . . 9 1/2 onces
Essence de menthe poivrée (*Mentha piperita*) 12 gouttes
Mucilage de gomme adraganthe (*Astragalus creticus*). . . . . q s
Pour faire des tablettes de 18 grains.

LES MÊMES AU BAUME DE TOLU.

℞ Carbonate de Soude (*Bicarbonate sodique*) pulvérisé . . . . . 1 once
Sucre blanc pulvérisé. . . . . 19 onces.
Baume de Tolu (*Toluifera balsamum*) pulvérisé 2 gros
Gomme adraganthe (*Astragalus creticus*) . 2 gros.
Eau . . . . . q s.
Pour faire des tablettes de 18 grains.

TABLETTES VERMIFUGES

Pour les enfans de 2 *à* 3 *ans.*

℞. Muriate de protoxide de mercure (*Chlorure mercureux*). . . . . 2 grains.
Sucre blanc pulvérisé. . . . . 10 grains.
Mucilage de gomme adraganthe (*Astragalus creticus*) q. s.
Pour faire une tablette.

LES MÊMES

Pour les enfans de 4 *à* 6 *ans.*

℞. Muriate de protoxide de mercure (*Chlorure mercureux*) . . . . . 4 grains.
Sucre blanc pulvérisé. . . . . 15 grains.
Mucilage de gomme adraganthe (*Astragalus creticus*) q. s.
Pour faire une tablette.

PILULES BALSAMIQUES LAXATIVES

R. Extrait d'absinthe (*Artemisia absinthium*).
» de chardon bénit (*Centaurea benedicta*)
» de fumeterre (*Fumaria officinalis.*)
» de petite centaurée (*Erythræa centaurium*)
» d'ellébore noir (*Helleborus niger.*)
Résine de lierre (*Hedera helix.*)
» mastic (*Pistacia lentiscus.*)
» sandaraque (*Thuja articulata.*)
Benjoin (*Styrax benzoin*)
Térébenthine de Venise (*Pinus larix*) de chaque 1 gros.
Aloës succotrin (*Aloe socotrina.*)
Myrrhe choisie (*Amyris kataf.*) . . . . . 6 gros

Après avoir pulvérisé séparément les résines, l'aloes, la myrrhe et le benjoin, on mêle toutes ces poudres dans un mortier de fer chauffé dans lequel on a mis les extraits et la térébenthine; on bat fortement pour obtenir une masse homogène.

PILULES PURGATIVES COMMUNES.

R. Aloës succotrin (*Aloe socotrina*) pulvérisé.
Racine de jalap (*Ipomœa jalapa*) » . . 2 gros.
Gomme résine gutte (*Stalagmites cambogioïdes*) pulvérisée. . . . . 1 gros.
Esprit de vin. . . . . q s

Pour faire des pilules du poids de cinq grains.

MASSE PILULAIRE DITE EXTRAIT CATHOLICUM.

R. Fruits de coloquinte (*Cucumis colocynthis*) mondés. . . . . 3 onces.
Agaric blanc (*Boletus laricis.*)
Racines d'ellébore noir (*Helleborus niger*) de chaque. . . . . 1 once.

Réduisez ces substances en poudre grossière et faites les bouillir dans huit livres d'eau distillée jusqu'à réduction de quatre livres, passez et faites évaporer au bain marie jus-

qu'en consistance de miel épais ajoutez.

Aloës succotrin (*Aloe socotrina*) en poudre. . 4 onces.
Scammonée d'Alep (*Convolvulus scammonia*) en poudre . . . . . 2 onces.
Mêlez avez soin

BAUME DE LUCATEL.

R. Cire jaune . . . . . 4 onces.
Huile d'olives (*Olea europæa*).
Térébenthine de Venise (*Pinus larix*) de chaque . . . . . 6 onces.
Baume du Pérou liquide (*Myroxylon peruiferum*) . . . . . 2 gros.
Santal rouge (*Pterocarpus santalinus*) en poudre fine . . . . . 1|2 once.

Faites liquéfier à une douce chaleur la cire, l'huile et la térébenthine, ajoutez y ensuite le baume du Pérou et la poudre de santal rouge et mêlez avec soin.

CÉRAT ÉPULOTIQUE.

R Oxide de zinc (*Oxide zincique*)
Cire jaune de chaque. . . . . 1 once.
Huile d'olives (*Olea europæa*) . . . . . 2 onces.

Faites liquéfier la cire et l'huile, ajoutez y l'oxide de zinc en poudre fine et mêlez exactement.

EMPLATRE DE BELLADONE.

R Emplâtre simple
Cire jaune de chaque . . . . . 3 onces.
Térébenthine de Venise (*Pinus larix*) . . 1 once
Huile d'olives (*Olea europæa*) . . . . . 1|2 once.
Poudre de feuilles de belladone (*Atropa belladona*). . . . . 2 onces.

Faites liquéfier sur un feu doux l'emplâtre, la cire, la Térébenthine et l'huile d'olives, ajoutez la poudre de belladone, remuez jusqu'à ce que la masse emplastique soit refroidie et formez en des magdaléons.

On prépare de la même manière,
L'Emplâtre de jusquiame (*Hyosciamus niger*,
» stramonium (*Datura stramonium*,

EMPLATRE DE POIX DE BOURGOGNE.

Poix de Bourgogne (*Pinus abies*)	18	onces
Cire jaune	6	onces

Faites liquéfier, passez à travers un linge peu serré et roulez en magdaléons.

TABLE DES MATIÈRES.

Acétate de morphine . . . . . pages 14
Acide tannique 15
Alcoolat d'Anhalt 24

Baume de Lucatel 28
Baume de vie d'Hoffmann 24

Cérat épulotique 28
Chlorhydrate de morphine 14
Chlorure aurique 8
Citrate de fer 13
Citrate ferrique 13
Cyanure de potassium 10
Cyanure de zinc 11
Cyanure potassique 10
Cyanure zincique 11

Décocté d'amidon 16
Décocté de carragaheen 15
Décocté de gayac composé 17
Décocté de lichen d'Islande 16
Décocté de racines de guimauve 16
Décocté de salep 17
Décocté des bois 17
Deuto-iodure de mercure 10

Eau d'Anhalt 24
Elixir parégorique de Londres 24
Emplâtre de belladone 28
Emplâtre de jusquiame 29
Emplâtre de poix de Bourgogne 29
Emplâtre de stramonium 29
Espèces aromatiques 15
Espèces pectorales 15
Extrait alcoolique de poivre enbèbe 18
Extrait catholicum 27
Extrait de laitue 18
Extrait éthéré de fougère mâle 18

Gelée de carragaheen 21

Huile éthérée de fougère mâle . . . . . pages 18
Hydrate ferrique . . . . . » 7
Hydriodate de potasse . . . . . » 8
Hydro cyano ferrate de quinine . . . . . » 14

Infusé antihémorrhoïdal . . . . . » 15
Infusé aromatique . . . . . » 15
Infusé de quassia . . . . . » 16
Infusé de valériane . . . . . » 16
Iodure de fer . . . . . » 6
Iodure de plomb . . . . . » 9
Iodure de soufre . . . . . » 8
Iodure ferreux . . . . . » 9
Iodure mercureux . . . . . » 10
Iodure mercurique . . . . . » 10
Iodure plombique . . . . . » 9
Iodure potassique . . . . . » 8

Masse pilulaire dite extrait catholicum . . . . . » 27
Morphine . . . . . » 11
Mucilage de carragahcen . . . . . » 17
Mucilage léger de gomme arabique . . . . . » 17
Mucilage léger de semences de coings . . . . . » 17
Muriate de morphine . . . . . » 14
Muriate d'or . . . . . » 8

Nitrate de protoxide de mercure . . . . . » 13
Nitrate mercureux . . . . . » 13

Pastilles de d'Arcet . . . . . » 26
Pastilles de d'Arcet au baume de Tolu . . . . . » 26
Pastilles de Vichy . . . . . » 26
Pastilles de Vichy au baume de Tolu . . . . . » 26
Peroxide de fer hydraté . . . . . » 7
Pilules balsamiques laxatives . . . . . » 27
Pilules purgatives communes . . . . . » 27
Proto-iodure de mercure . . . . . » 10
Prussiate de quinine . . . . . » 14

Sirop d'absinthe . . . . . » 19
Sirop d'acétate de morphine . . . . . » 20
Sirop d'anis . . . . . » 18
Sirop d'asperges . . . . . » 19
Sirop de belladone . . . . . » 18
Sirop de citrate de fer . . . . . » 20
Sirop de gomme arabique . . . . . » 18
Sirop de manne . . . . . » 20

Sirop de pivoine . . . . . pages 20
Sirop de sulfate de morphine . . . . . » 20
Sirop de thridace. . . . . » 21
Strychnine . . . . . » 12
Sulfate de morphine . . . . . » 14

Tablettes de carbonate de soude . . . . . » 20
Tablette de carbonate de soude au baume de Tolu. . » 26
Tablettes vermifuges pour les enfans de 2 à 3 ans. . » 26
Tablettes vermifuges pour les enfans de 4 à 6 ans . . » 26
Tannin . . . . . » 13
Teinture de baies de genévrier . . . . . » 21
Teinture de belladone. . . . . » 22
Teinture de bryone blanche . . . . . » 22
Teinture de bulbes de colchique . . . . . » 22
Teinture de jusquiame . . . . . » 23
Teinture de lobelia inflata . . . . . » 23
Teinture de ratanhia . . . . . » 25
Teinture de subine . . . . . » 23
Teinture de semences de colchique . . . . . » 25
Teinture de stramonium. . . . . » 25
Teinture d'iode . . . . . » 22
Teinture d'opium camphrée . . . . . » 24
Teinture éthérée de digitale . . . . . » 25
Teinture éthérée de lobelia inflata . . . . . » 25
Teinture éthérée de valériane. . . . . » 25
Teinture éthérée d'iode. . . . . » 25
Thridace. . . . . » 18

Vératrine . . . . . » 12
Vinaigre de colchique . . . . . » 21
Vin de bulbes de colchique. . . . . » 21

99941699